



بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
۸ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ - دانشگاه صنعتی شیراز



کاهش فلورسانس نمونه‌های دارویی در طیف‌سنجی رامان با استفاده از روش بی‌رنگ سازی نوری

نجمه صادق، حسین خادم و سیدحسین توسلی

دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما

چکیده - در این مقاله، روشی برای بهبود نسبت سیگنال رامان به طیف فلورسانس در طیف‌سنجی رامان ارائه شده است. در این روش با تاباندن نور لیزر قبل از طیف‌گیری، فلورسانس نمونه کم می‌شود در حالیکه سیگنال رامان را به طور حداقل تحت تاثیر قرار می‌دهد و در نتیجه امکان دستیابی به نسبت سیگنال رامان به فلورسانس بالاتر را فراهم می‌کند. امکان‌سنجی این روش در مطالعه‌ی طیف رامان قرص استامینوفن که فلورسانسی قوی در طول موج استفاده شده دارد، بررسی شده است. کلید واژه - بی‌رنگ سازی نوری، طیف‌سنجی رامان، فلورسانس

Fluorescence Suppression in Raman Spectroscopy Using Photobleaching Method for Pharmaceutical Samples

Najmeh sadegh, Hossein Khadem, Seyed Hassan Tavassoli

Shahid Beheshti University, laser and plasma institute

Abstract-in this article we offered a method for improving the ratio of signal to fluorescence in Raman spectroscopy based on photobleaching. It was demonstrated to be a simple approach to remote reduction and suppression the magnitude of the fluorescent background reduced exponentially with time. Pre-exposure to laser light significantly reduces sample autofluorescence, but minimally affects Raman signals. We demonstrated the capability of this method for Raman spectral measurements of acetaminophen tablets.

Keywords: fluorescence reduction, Photobleaching, Raman spectroscopy

۱- مقدمه

بازسازی می‌شود. در روش SERS نیاز به آماده سازی زیرلایه و روش های شیمیایی پیچیده‌ای وجود دارد. از مرور سایر روش های کاهش فلورسنس در اینجا صرف نظر می‌کنیم.

یکی از روش های کم هزینه که در عین حال می‌تواند به طور موثر فلورسنس زمینه را کاهش دهد روش بی‌رنگ سازی نوری^۴ است. در این روش در یک بازه زمانی، نور لیزر به نمونه تابانده می‌شود. به طوری که فلوروفور موجود در نمونه، توانایی تابش فلورسنس خود را در اثر تحریک شیمیایی القا شده توسط تابش فوتون از دست می‌دهد [1,2]. مکانیزم اصلی بی‌رنگ سازی نوری تاکنون مشخص نشده است اما تصور می‌شود که وقتی نمونه برای مدت نسبتاً زیادی در معرض تابش نور لیزر قرار می‌گیرد، گذاری از حالت برانگیخته‌ی یگانه به تراز برانگیخته‌ی سه‌گانه رخ می‌دهد که این تراز در مقایسه با تراز برانگیخته‌ی یگانه نیمه عمر بالاتر و واکنش پذیری شیمیایی بیشتری دارد. بسیاری از واکنش های بیرنگ کننده در این اولین حالت برانگیخته‌ی سه گانه رخ میدهد؛ گذار بین این تراز با تراز های سه گانه و یگانه‌ی اتمهای مجاور سبب تخریب فلوروفور نمونه میشود و قابلیت تابش فلورسنس خود را از دست میدهند. لذا از این روش می‌توان در مواردی که فلورسانس، ناشی از ناخالصی‌های موجود در نمونه باشد بهره برد [4].

در این مطالعه، اثر بی‌رنگ سازی نوری روی کیفیت طیف رامان و اثر آن روی فلورسنس زمینه برای نمونه‌ی فلورسنت قرص استامینوفن بررسی می‌شود.

۲- روش تجربی

آزمایش روی نمونه‌ی شدیداً فلورسنت قرص استامینوفن انجام شد. طیف رامان با استفاده از یک طیف‌سنج OceanOptics دارای تک توری HC-1 با تعداد خط 1200 line/mm ثبت شد. از لیزر Nd:YAG پیوسته با طول موج ۵۳۲ نانومتر به عنوان منبع تابش برانگیزی استفاده شد. طرح ساده‌ای از این چیدمان آزمایشگاهی در شکل ۱ نشان داده شده است. در این چیدمان نور پراکنده شده از نمونه در آرایش هندسی ۱۸۰ درجه توسط لنز جمع آوری و پس از عبور از یک فیلتر (برای جدا کردن پراکندگی

امروزه طیف‌سنجی رامان به عنوان روشی غیر مخرب برای مطالعه‌ی ترکیب و ساختار گسترده‌ی فراوانی از مواد، در سطح میکروسکوپی توجه بسیار زیادی را جلب کرده است. علیرغم اینکه طیف‌سنجی رامان یک روش مفید محسوب می‌شود؛ سطح مقطع کم سیگنال‌های رامان، باعث سختی اندازه‌گیری آنها می‌شود. این قضیه در نمونه‌هایی که دارای طیف فلورسنس شدیدی هستند مشهود است. اگر نمونه با طول موجی در نزدیکی گذار الکترونی آن برانگیخته شود معمولاً سیگنال رامان با تابش پهن فلورسانس نمونه ادغام می‌شود. تابش فلورسنس چندین مرتبه قوی‌تر از پراکندگی رامان است و این مانع از آشکار شدن سیگنال رامان نمونه می‌شود؛ لذا برای تحلیل کمی طیف رامان بسیاری از نمونه‌ها، حذف زمینه‌ی فلورسنس، از مهمترین چالش‌هایی است که با آن مواجه می‌شویم.

برای این منظور تاکنون روش‌های مختلفی بر مبنای رویکردهای آزمایشگاهی- ابزاری و محاسباتی به کار گرفته شده است. ساده‌ترین گزینه، استفاده از طول موج های برانگیزی خارج از ناحیه‌ی جذب نمونه است. نمونه‌های دارویی معمولاً دارای جذبی قوی در ناحیه‌ی مرئی می‌باشند. استفاده از طول موج‌هایی در ناحیه‌ی فرورسرخ نزدیک یا فرورسرخ، موثر به نظر می‌رسد اما از آنجایی که شدت سیگنال رامان با توان چهارم فرکانس رابطه‌ی مستقیم دارد لذا سیگنال‌های رامان ضعیف‌تری خواهیم داشت. به کارگیری طول موج های در ناحیه‌ی فرابنفش می‌تواند سبب تجزیه‌ی شیمیایی و اثرات تخریبی روی نمونه شود [2]. در روش‌های دیگر مانند روش بازه‌ی زمانی^۱، طیف‌سنجی اختلافی رامان انتقالی (SERDS)^۲ و طیف‌سنجی رامان تقویت یافته سطحی (SERS)^۳، به تجهیزات آزمایشگاهی خاص همچون لیزرهای پالسی و لیزرهایی با طول موج قابل تنظیم نیازمند هستیم. در روش SERDS دو طیف رامان بدست آمده از دو طول موج برانگیزی نزدیک به هم از یکدیگر کم شده و با یک روند محاسباتی طیف رامان نهایی

¹ Time-gating method

² Shifted Excitation raman difference spectroscopy (SERDS)

³ Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS)

⁴ Photobleaching method

[3] Kolesov, Mikhail, Mikhailenko, Boldyrev, Morris, Dynamics of the intermolecular hydrogen bonds in the polymorphs of paracetamol in relation to crystal packing and conformational transitions, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 13(2011), 14243–14253

[4] <http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/fluorescence/photobleaching>

شدن پیک‌های کوچکتر همچون 712 cm^{-1} و 394 cm^{-1} و 332 cm^{-1} شده است.

لازم است متذکر شویم زمان تابش مورد نیاز برای هر نمونه متفاوت است و باید به طور آزمایشگاهی تعیین شود. همچنین تاباندن بیش از حد لیزر به نمونه می‌تواند سبب تغییر ساختاری و شیمیایی نمونه شود [1].

نتیجه‌گیری:

نمونه‌های دارویی و بیولوژیکی دارای طیف جذب بسیار قوی در ناحیه‌ی مرئی هستند. این جذب قوی، خود را به صورت طیف زمینه‌ی فلورسنس شدیدی در طیف‌سنجی رامان نشان می‌دهد. برای کاهش طیف زمینه‌ی فلورسنس و افزایش نسبت سیگنال رامان به فلورسنس (R/F) روش‌های متعددی وجود دارد که در این مقاله از روش بی‌رنگ سازی نوری استفاده شد. در این روش نور لیزر در بازه‌های زمانی مختلف به نمونه تابانده شد و ملاحظه شد که با افزایش زمان نوردهی، نسبت R/F بصورت نمایی افزایش می‌یابد. اما این افزایش برای زمان‌های نوردهی خیلی زیاد به حالت ثابتی میل می‌کند. بنابراین الزاما با افزایش خیلی زیاد زمان نوردهی، نسبت R/F زیاد نخواهد شد. لازم به ذکر است که این روش صرفاً برای نمونه‌هایی مناسب است که نسبت به تابش نور لیزر حساس نباشند. پیشنهادات:

- بررسی وابستگی نرخ اثر بیرنگ سازی نوری به شدت‌های مختلف فرودی بر نمونه
- بررسی وابستگی اثر بیرنگ سازی نوری در دماهای متفاوت و اکسیژن محیط

مراجع

[1] Macdonald M.A., Wyeth P., "on the use of photobleaching to reduce fluorescence background in raman spectroscopy to improve the reliability of pigment identification on painted textiles", *J. Raman Spectrosc.* 37(2006) 830–835

[2] callender, sahar, mandair, golcuk, "Is photobleaching necessary for raman imaging of bone tissue using a green laser?" *Biochimica et Biophysica Acta*, 1758 (2006) 868–873